

GLOSSAIRE

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE

ETYMOLOGIE

HYSTER(O) (gr.) : utérus
METR(O) (lat.) : utérus
COLP(O) (gr.) : vagin
GYN GYNECO (gr.) : féminin
COEL (gr.) : ventre
SALPING (gr.) : trompe
OVAR(O) (lat.) : ovaire
CERVIC(O) (lat.) : col – utérin
RRHEE (gr.) : écoulement
RRAGIE (gr.) : saignement
MEN(O) (lat.) : mois
TOCO – TOCIE (gr.) : accouchement
GALACT (gr.) : lait
LACT (lat.) : lait
MAST (gr.), MAMM (lat.), SEN (-) : sein, mamelle

Suffixe ITE : inflammation

AMENORRHEE :

Absence de flux menstruel, en dehors de l'état de grossesse, chez une femme en période d'activité génitale.

DYSMENORRHEE :

Menstruation difficile et douloureuse.

DYSPLASIE :

Toute anomalie au cours du développement d'un tissu ou d'un organe.

DYSTOCIE :

Accouchement difficile quelles qu'en soient les causes.

DYSTROPHIE :

Trouble de la nutrition d'un organe ou d'une partie anatomique ; lésions qui en sont la conséquence.

EPISIOTOMIE :

Incision du périnée en partant de la commissure postérieure de la vulve.

EUTOCIE :

Accouchement normal, sans complications.

GALACTORRHEE :

Écoulement excessif de lait, chez une femme qui allaite ou écoulement spontané de lait en dehors de la lactation.

GESTRONE :

Synonyme folliculine.

GRAVIDIQUE :

Qui a rapport avec la période de grossesse.

GYNECOLOGIE :

Branche de la médecine qui traite des maladies de l'appareil génital de la femme, y compris les seins. Le spécialiste est le gynécologue.

HYPOMENORRHEE :

Insuffisance de l'écoulement menstruel.

HYSTERECTOMIE :

Ablation totale ou partielle de l'utérus.

LEUCORRHEE :

Écoulement muqueux ou mucopurulent, se faisant par la vulve, dû généralement à une infection microbienne, parasitaire ou mycosique.

MASTECTOMIE :

Ablation de la glande mammaire (synonyme : mammectomie).

MASTITE :

Inflammation de la glande mammaire.

MASTODYNIE :

Tension douloureuse des seins, observée surtout au cours de la période prémenstruelle.

MENOMETRORRAGGIE :

Association de ménorragies et de métrorragies.

MENOPAUSE :

Fin de la période menstruelle. Elle correspond à la cessation de l'activité ovarienne et s'accompagne d'une régression des caractères sexuels.

MENORRAGIE :

Exagération de l'écoulement menstruel soit en qualité, soit en durée.

MENORRHEE :

Écoulement des règles.

MENSTRUATION (ou flux menstruel ou règles) :

Phénomène physiologique de la femme en période d'activité génitale, lié à la fonction de reproduction consistant en un écoulement sanguin d'origine utérine, se reproduisant tous les mois, sauf pendant la grossesse.

MENSTRUEL (cycle) :

Succession périodique chez la femme, des phénomènes utéro-vaginaux déclenchés par les sécrétions ovariennes et destinés à préparer l'appareil génital à la nidation d'un œuf. Ce cycle comprend : une phase proliférative, une phase de pré-nidation, et si l'ovule n'est pas fécondé, une phase menstruelle hémorragique.

METRALGIE :

Douleur utérine.

METRORRAGIE :

Hémorragie utérine survenant en dehors des règles.

MULTIGESTE :

Se dit d'une femme qui est enceinte au moins pour la deuxième fois.

MULTIPARE :

Femme qui a eu plusieurs enfants.

MYOME :

Tumeur bénigne formée par du tissu musculaire.

MYOMETRE :

Muscle utérin.

NULLIGESTE :

Se dit d'une femme qui n'a jamais été enceinte.

NULLIPARE :

Se dit d'une femme qui n'a pas eu d'enfant.

OESTROGENE :

Qui provoque l'œstrus. Toute hormone stéroïde sexuelle ou ses équivalents synthétiques qui ont la propriété de provoquer chez la femelle les modifications survenant au cours de l'œstrus (correspondant chez la femme à la période de l'ovulation). Les hormones œstrogènes sont sécrétées par l'ovaire (œstradiol, œstrone) par le placenta (œstriol) et accessoirement par la corticosurrénale et par les cellules interstitielles du testicule. Les principaux effets des œstrogènes sont : la stimulation de la croissance des organes génitaux féminins et des glandes mammaires, la stratification de la muqueuse vaginale, la prolifération de la muqueuse utérine et la stimulation des sécrétions vaginales pendant la phase folliculaire du cycle en vue d'une fécondation et d'une nidation de l'œuf. La production des œstrogènes par l'ovaire est stimulée par les gonadotrophines anté-hypophysaires (notamment la gonadotrophine A).

OCYTOCINE :

Hormone sécrétée par l'hypothalamus et stockée dans le lobe postérieur de l'hypophyse. Elle excite les contractions de l'utérus et favorise la sécrétion lactée.

ŒSTRUS OU ŒSTRAL (cycle) :

Modification périodique de l'utérus et du vagin déclenchée par les sécrétions ovariennes et qui préparent à la fécondation et à la gestation.

PARTURIENTE :

Femme qui accouche.

PELVIMETRIE :

Mensuration du diamètre du bassin à l'aide d'un pelvimètre.

PRIMIGESTE :

Femme qui est enceinte pour la première fois.

PRIMIPARE :

Femme qui accouche pour la première fois.

PROGESTERONE :

Hormone stéroïde sécrétée par le corps jaune pendant la période post-ovulatoire du cycle, par le corps jaune gravidique au cours de la grossesse (jusqu'à la 12^{ème} semaine) puis par le placenta jusqu'au lendemain de l'accouchement. Sous l'influence de la progestérone, la muqueuse de l'utérus s'épaissit pour permettre la fixation et le développement de l'œuf fécondé.

SPANIOMENORRHEE :

Allongement de l'intervalle qui sépare les règles.

SYNECHIE :

Adhérence, accolement ou soudure plus ou moins étendu de deux tissus qui sont normalement séparés.

THELITE :

Inflammation du mamelon.

Document réactualisé en septembre 2003.

Bibliographie : Dictionnaire Médical MASSON, 7^{ème} édition, 1996.