

Leptospiroses

- zoonoses dues à des spirochètes du genre Leptospira
- maladie des pays chauds & humides (milieu aquatique)
- incidence 30 x > autre mer / France (0,4 / 100 000)
- réservoir: rongeurs (élimination leptosp. dans urines)
- Transmission directe: morsure de rat
- Transmission indirecte (b + s): baignade
- éleveurs, équestres (mal. prof), vétérinaires, ouvriers des abattoirs & baigneurs eau douce.
- pénétration par les plaies.

• Leptospirose ictero-hémorragique (clinique)

- incubation: 6 à 10 j
- début brutal, Ed septique, myalgies ++, conjonctivite, rash cutané, épistaxis, Ed méningé oncostant.
- atteinte hépatique: ictère dans 50% au 4^e - 6^e jour
- atteinte rénale: protéinurie, leucocyturie, parfois $\angle$ rénale
- possible: méningite, myocardite, Ed détresse respiratoire aiguë (SDRA)
- hyperleucocytose ou thrompénie
- bactérié difficile, sérologie difficile

tt:
- pénicilline G en perf
- cyclines en cas d'allergie pén
- durée tt: 10 jours
- hémodialyse si $\angle$ rénale

prophylaxie: vaccination professionnelle à haut risques
port gants, bottes, lunettes, vêt. imper. des expositions
maladie à déclaration obligatoire.