

Rôle infirmier avec les médecins en P

• Les thymorégulateurs

chez la f^- en âge de procréer: test de G , mettre en place +
contracept°

contrôle bio: rénal, thyroïdien, hépatique & hématologique à
renouveler.

→ Surveiller les effets du tt

- lithémie: a' 5g ; 15g ; 1 mois puis tous les mois.
médec au long cours.

Pour la déparmine: ≤ 1 chez la PA

a' doses progressives $\rightarrow$ de la pose tous les 3a' 3j

a' prendre au milieu du repas: gastralgie.

Veiller a' l'observance du tt : ≤ 1 no pas oublier de prise.

• Les hypnotiques

Pour 1 durée de 3a' 4 semaines max.

Bien faire boire le patient: bouche sèche.

Le faire verbaliser ses anxiétés.

Généralement ont peur de la nuit: moment privilégié pour essayer
de connaître la cause de l'anxiété.

≤ 1 a' l'heure de l'administration du tt .

• Les anxiolytiques

env: anxiété volontaire médicamenteuse

très su: aux anxiolytiques

4a' 12s environ, diminution progressive des doses.

• Les antidépresseurs

début du tt antidépresseur:

1 risque de lever d'anxiété avec passage a' l'acte: évaluer le

risque suicidaire (paroles, comportement) & assurer sécurité de la personne (retirer les objets dangereux).

2. surveiller l'observance du ttt : l'informat° & l'éducat° de la personne au ttt

3. évaluer les effets attendus : & manifestat° dépressives
" " " " : anxiété, somnolence, hypo T,

Prise conseillée en milieu de repas. Administrat° au 17h.
Certains sédatifs plus que d'autres.

Ne jamais arrêter 1 ttt antidépresseur du jour au lendemain.

Déconseiller en cas de prise OH

Surveillance constipat° : conseils hygiène alimentaire, forte boisson de l'eau.
Soins de bouche : "brosse à dents"

Les neuroleptiques

- Surveiller l'observance du ttt

- Informer le PS au regard des effets secondaires & lui donner des conseils

- Évaluer les effets thérapeutiques attendus

- Surveiller les effets secondaires : T°, TA, poids, T° (Ed malin)