INFECTIONS VULVO VAGINALES

UF Santé publique
Mme JOUFFROY
09/11/2006

PH Vaginal = acide 3 ou 4 maintenu par la flore et le bacille de doderlin
Permet de se protéger contre les infections

Maintenu grâce aux œstrogènes

Risque d'infection si PH modifié, perturbation hormonale(puberté, grossesse, ménopause)

Définition :

Infection causée par un champignon (levure), des bactéries ou des virus

- Cervicite : infection du col
- Vulvite : infection de la vulve
- Urétrite
- Bartholinite

Touche ¾ femme dans leurs vies et 75 % au moins 1 fois

Signes cliniques :

- prurit
- leucorrhées(aspect lait caillé, malodorante, épaisse)
- dyspareunies (douleurs pendant les rapports)
- vésicules herpétiques
- inflammation de la vulve
- brûlure urinaire
- lésions cutanées des muqueuses
- fièvre
- abcès
- Troubles mictionnels : fréquente et impérieuses
- Œdème, ulcération

Différents types d'infection :

- vulvo-vaginite **à trichomonas** :
 - o causé par un parasite
 - o asymptomatique
 - o transmission vénérienne
- vulvo-vaginale **mycosique**
 - o Par un champignon : « candida albican »
 - o infection intestinale
 - o 15% ou 25% des infections
 - o s'étendant sur le périnée
- vulvo-vaginite ou cervicite **gonocoque**(bactérie)
 - o contamination sexuelle
- vulvo-vaginite **à chlamydia** (bactéries)et mycoplasme
 - o source de stérilité
 - o asymptomatique
 - o associé à des trichomonas

Figure 3

Facteurs favorisants (cf polycopiés)

- perturbation hormonale
- menstruations
- ménopause, grossesse
- contamination génitale
- examen génital
- traitement antibiotique
- hygiène intime : trop ou pas assez d'hygiène
- immunodépression

Traitements

- Crème vaginale
- Ovule
- Préparation antifongique (f polycop médicaments gynéco)
- Antibiotique
- Antiparasitaire

Soit en local, per os, IV

Actions prévention

- primaire
 - o prévenir la survenue :
 - toilette régulière ni trop ni trop peu
 - éviter les pantalons trop serrés, sous vêtements en coton
 - boire beaucoup
 - éviter les protèges slips, et serviette hygiéniques
 - éviter le stérilet chez la nullipare
 - bien sécher après la douche
 - essuyer d'avant en arrière
 - éviter douche vaginale trop fréquente
 - pas de savon
 - vider la vessie après un rapport sexuel
 - linge perso et propre
 - préservatif
 - limiter les partenaires
- secondaire
 - o éviter les rechutes ne pas arrêter le TTT en cours
 - o dépistage
 - o éviter qu'une infection basse se transforme en infection haute
- tertiaire
 - o surveillance et traitement

Rôle propre

- rapports sexuels protégés pendant 6 mois pour les condylomes (tumeur bénigne causée par les papillomavirus PHV)
- réaliser des soins locaux
- éduquer et informer sur l'hygiène de vie
- questionner, sur les signes d'apparition
- lavage des mains
- pour les ovules doit rester allongée ½ h après la pose

Condylome du col

Complication

- Risque d'infection en chaîne
- Risque de propagation de bas à haut = stérilité
- Risque infectieux néonatal
- Risque de récurrence

Les rapports sexuels sont interdits tant que l'infection n'est pas guérie, éviter les douches vaginales

Diagnostic infirmier

- infection et risque infectieux
- douleurs
- dysfonctionnement sexuel
- manque de connaissances en hygiène = démarche éducative